

Sortiment kupusnjača za Hrvatsku i Sloveniju 2025-2026



BIJELI KUPUS



Sonsma RZ F1

- Špičasti kupus brzog porasta vegetacije 50-60 dana
- Formira glavice s kratkim kocenom, prosječne mase 0,8-2,0 kg svježe zelene boje
- Ističe se slatkim, sočnim listovima, idealnim za svježe salate
- Biljka je umjerene energije rasta zbog kojeg je moguć gusti sklop sadnje
- Hibrid prikladan za najraniji uzgoj u zaštićenom prostoru i na otvorenom

Preporučeni sklop sadnje: 40-70.000 biljaka/ha



Jetma RZ F1

- Najraniji kupus u našoj ponudi koji je spreman za berbu već za 53 dana
- Donji listovi su kompaktni pa dobro podnosi gusti sklop sadnje
- Brzo formira kompaktne glavice prosječne mase 0,8-1,5 kg
- Ima dobar porast u uvjetima kratkog dana kod proizvodnje u rano proljeće pa je dobar izbor za ranu proizvodnju u plastenicima
- Preporučujemo ga za sadnju od sredine veljače u zaštićenom prostoru te od sredine ožujka na otvorenom

Preporučeni sklop sadnje:
u zaštićenom prostoru 60-70.000 biljka/ha,
na otvorenom 45-55.000 biljaka/ha
Otpornost: HR: Foc:1



Zarissima RZ F1

- Rani kupus okruglih glavica, po dužini vegetacije (53-56 dana) smještamo ga između najranije Jetme RZ i univerzalne Pushme RZ
- Prikladan za uzgoj u zaštićenom prostoru i na otvorenom
- Brzo formira ujednačene okrugle glavice koje dostižu prosječnu masu 0,9-1,5 kg
- Kompaktne glavice idealne su za slaganje u gajbice
- Tvrdе glavice imaju kratki kocen, a ovojno lišće je sjajno zelene boje
- Biljka je kompaktna, umjerene snage s uspravnim listovima
- Ima odličnu otpornost na bolesti i na procjetavanje
- Odlično podnosi rast u gustom sklopu sadnje (40 x 40-45 cm)

Preporučujemo sadnju 60-65.000 biljaka/ha

Manessa RZ F1

- Kupus koji brzo formira glavice prikladne za svježu potrošnju ili preradu
- Hibrid vegetacije 65-70 dana kompaktne strukture glavice
- Formira okrugle do blago plosnate glavice prosječne mase 2,0-3,5 kg, ovisno o sklopu sadnje
- Snažna biljka iznimne energije porasta
- Duga stabilnost u polju bez pucanja i gubitka kvalitete
- Odlično podnosi visoke temperature i nedostatak vlage – odličan izbor za ljetnu berbu
- Hibrid nije osjetljiv na unutarnju rubnu palež i na tripsa
- Prikladan za sadnju od kraja ožujka (ispod agrila) pa do prvog tjedna kolovoza

Preporučeni sklop sadnje: 36-40.000 biljaka/ha
Otpornost: HR: Foc:1



Felissima RZ F1

- Rani kupus brzog porasta, vegetacije 57-60 dana
- Odlična kombinacija ranozrelosti, energije rasta i volumena glavica
- Formira okrugle do blago plosnate glavice prosječne mase 1,0-2,4 kg
- Ujednačena biljka umjerene energije rasta s uspravnim rastom listova
- Hibrid prikladan za ranu proizvodnju u zaštićenom prostoru i prve sadnje na otvorenom
- Zahvaljujući blagom okusu, svježem izgledu i sjajno zelenoj boji, odličan izbor za ranu ponudu mladog kupusa

Preporučeni sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha
Otpornost: HR: Foc:1



Pushma RZ F1

- Hibrid vegetacije 55-58 dana
- Formira pravilno okrugle glavice prosječne mase 1,3-2,0 kg svježe zelene boje
- Odlična stabilnost u polju, do 10 dana bez pucanja glavica
- Nije osjetljiv na procvjetavanje
- Brz porast i snažna lisna masa sprječavaju naknadni rast korova
- Glavice se formiraju relativno visoko – bolje strujanje zraka, manje bolesti
- Odlična ujednačenost, iznimno visoki prinosi
- Preporučujemo ga za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom

Preporučeni sklop sadnje: 55-65.000 biljaka/ha





Tacoma RZ F1

- Kupus vegetacije 75 dana koji formira plosnate glavice
- Prosječna masa glavica je 1,3-2,5 kg s tankim listovima i slabo izraženim venama
- Zahvaljujući iznimno snažnom korijenovom sustavu, hibrid je lagan za uzgoj i time siguran izbor za proizvođača
- Lisna masa nije sklona gljivičnim i bakterijskim oboljenjima, kao i ni napadu tripsa
- Kultivar je prikladan za svježju potrošnju te za kiseljenje rezanog ili cijelih glavica
- Preporučujemo za sadnju od ožujka do početka kolovoza

Preporučeni sklop sadnje: 35-40.000 biljaka/ha
Otpornost: HR: Foc:1 IR: Xcc/Tt



Swingma RZ F1

- Hibrid vegetacije 75-80 dana namijenjen za svježju potrošnju
- Iznimno ujednačene okrugle glavice svježje zelene boje listova
- Biljka umjerene snage, prikladna za gušći sklop
- Brz porast glavice prosječne mase 1,5-2,4 kg, ovisno o sklopu sadnje
- Kratki kocen s odličnom unutarnjom kvalitetom i strukturom glavice
- Može izdržati u polju 7-10 dana nakon dolaska u berbu bez gubitka kvalitete
- Preporučujemo za prve proljetne sadnje pa do kraja srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 37-42.000 biljaka/ha
Otpornost: HR: Foc:1



Twistma RZ F1

- Kupus vegetacije 75-95 dana koji formira robusnu, snažnu biljku
- Formira okrugle glavice prosječne mase 2,0-3,8 kg
- Glavice su prikladne za svježju potrošnju i preradu (rezanje, kiseljenje)
- Prilagodljiv hibrid na različite rokove sadnje i tehnologiju proizvodnje
- Bez gubitka kvalitete može stajati u polju duže vrijeme
- Nije osjetljiv na gljivična i bakterijska oboljenja
- Prikladan sa sadnju od ranog proljeća do sredine srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 35-40.000 biljaka/ha
Otpornost: HR: Foc:1 IR: Xcc, Tt

Bluesma RZ F1

- Kupus vegetacije 80-85 dana okruglih glavica idealnih za supermarkete
- Snažna lisna masa plavičasto zelene boje s izraženom voštanom prevlakom
- Glavice prosječne mase 2,0-4,0 kg (ovisno o sklopu) koje se lako čiste
- U proizvodnji zadnjih nekoliko godina je pokazao odlične rezultate u pogledu otpornosti na bakterijske bolesti
- Iznimna ujednačenost u pogledu veličine i oblika glavica te stajanja u polju bez pucanja
- Osim za svježu potrošnju, prikladan i za kraće skladištenje
- Preporučujemo za sadnju od početka travnja do kraja srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 38-42.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Foc:1 IR: Xcc



Congama RZ F1

- Kupus vegetacije 105-110 dana, okruglih glavica idealnih za supermarkete
- Prosječna masa glavica 1,5-3,5 kg, s izraženom voštanom prevlakom plavičastog lišće
- Kompaktna otvorena biljka odlično podnosi gusti sklop sadnje
- Nije osjetljiv na bolesti i na napad tripsa
- Čvrste glavice odlične kvalitete odlično podnose duže skladištenje koje se lako čiste
- Prilagodljiv hibrid za uzgoj na različitim tipovima tla
- Iznimna ujednačenost u pogledu veličine i oblika glavice
- Preporučujemo za sadnju od travnja do početka srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 38-46.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Foc:1



Gintama RZ F1

- Pravi višenamjenski hibrid – idealan za svježu potrošnju, industrijsku preradu i srednje dugačko skladištenje
- Prosječna masa glavica 2,0-4,0 kg koju doseže 90-95 dana nakon sadnje
- Formira ujednačene blago plosnate glavice koje se lako režu
- Zahvaljujući formi biljke, dobre rezultate daje i u ekstenzivnim uvjetima proizvodnje
- Vanjski listovi (5-7) imaju atraktivnu svježiju zelenu boju
- Hibrid koji daje najbolju kvalitetu glavica nakon kiseljenja
- Zbog kratkog koca, visokog sadržaja suhe tvari i vlaknima ima mali kalo nakon kiseljenja
- Nije osjetljiva na gljivične i bakterijske bolesti, kao ni na napad tripsa
- Odlično podnosi visoke temperature zbog čega je moguće postići visoke prinose i u ljetnom periodu uzgoja
- Ima snažan korijenov sustav i brz porast što ga čini prikladnim za različite tipove tla

Preporučeni sklop sadnje: 35-40.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Foc:1





Lagrima RZ F1

- Hibrid vegetacije 110-120 dana
- Odličan za svježnu potrošnju, srednje dugo skladištenje i industriju
- Okrugle do blago plosnate glavice dostižu masu od 2,0-5,5 kg
- Glavice su svježije zelene boje, lako se čiste
- Pouzdan hibrid za proizvodnju čak i u najtežim uvjetima
- Odlično podnosi gušći sklop sadnje, čak i do 48.000 bilj/ha
- Snažna energija rasta lisne mase koja nije osjetljiva na Xanthomonas i napad tripsa
- Preporučujemo za sadnju od početka travnja do kraja lipnja

Preporučeni sklop sadnje: 29-46.000 biljaka/ha
Otpornost: HR: Foc:1





Flexima RZ F1

- Kupus za svježiju potrošnju i skladištenje vegetacije 120-125 dana s izraženom voštanom prevlakom
- Formira okrugle glavice prosječne mase 1,2-3,0 kg koje se lako beru i čiste
- Hibrid formira glavice iznimne ujednačenosti po veličini i unutrašnjom kvalitetom
- Visoka biljka prikladna za mehaniziranu berbu se ističe uspravnim rastom listova i otpornošću na tripsa
- Velik broj ovojnog lišća glavice ima tamnozeleni boju – prednost kod čišćenja

Preporučeni sklop sadnje: 30-42.000 biljaka/ha



Naziv kultivara	Vegetacija (dana)	Oblik glavice	Namjena	Masa glavice (kg)	Otpornost	Napomena	Sklop (bilj/ha)
Sonsma RZ	50-60	špičasti	tuneli/otvoreno	0,8-2,0	-	Iznimno ukusan	40-70.000
Jetma RZ	52	okrugli	tuneli/agril	0,8-1,5	HR: Foc:1	Najraniji hibrid	60-70.000
Zarissima RZ	52-56	okrugli	tuneli/agril	0,9-1,5	-	Rani okrugli	60-65.000
Pushma RZ	55-58	okrugli	tuneli/agril	1,3-2,0	-	Rani visoki prinos	55-65.000
Felissima RZ	57-60	okrugli	tuneli/agril	1,0-2,4	HR: Foc:1	Atraktivne glavice	40-60.000
Manessa RZ	65-70	okrugli/ blago plosnati	svježe/prerada	2,0-3,5	-	Brzi porast	36-40.000
Tacoma RZ	75	plosnati	svježe/prerada	1,3-2,5	HR: Foc:1	Brzi plosnati	35-40.000
Swingma RZ	75-80	okrugli	svježe	1,5-2,4	HR: Foc:1	Svježi izgled	37-42.000
Twistma RZ	75-95	okrugli	svježe/prerada	2,0-3,8	HR: Foc:1 IR: Xcc/Tt	Prilagodljivost	35-40.000
Bluesma RZ	80-85	okrugli	svježe	2,0-4,0	HR: Foc:1 IR: Xcc	Otpornost	38-42.000
Gintama RZ	90-100	blago plosnati	svježe/prerada	1,5-4,5	HR: Foc:1	Za sve namjene	35-40.000
Congama RZ	105-110	okrugli	svježe/prerada	1,5-3,5	HR: Foc:1	Supermarketi	38-46.000
Lagrima RZ	110-120	okrugli	svježe/prerada/skladištenje	2,0-5,5	HR: Foc:1	Za sve namjene	29-46.000
Flexima RZ	120-125	okrugli	svježe/skladištenje	1,2-3,0	HR: Foc:1	Za prezimljavanje	30-42.000

CRVENI KUPUS



Redma RZ F1

- Hibrid vegetacije 80 dana
- Okrugli oblik glavice tamno crvene boje
- Prosječna masa: 1,5-3,0 kg
- Jak porast biljke, dobra održivost u polju
- Idealan za berbu u ljetnom i jesenskom period, za srednje dugo skladištenje

Preporučeni sklop sadnje: 30-40.000 biljaka/ha



Rexoma RZ F1

- Hibrid vegetacije 120 dana
- Okrugle glavice dostižu prosječnu masu od 2,0-3,5 kg
- Tamno crvena boja, fine unutarnje strukture glavice
- Nije sklon rubnoj paleži
- Odličan izbor za skladištenje
- Pouzdani hibrid za sve tipove tala

Preporučeni sklop sadnje: 27-40.000 biljaka/ha



Futurima RZ F1

- Jedinstveno rješenje za industrijsku namjenu
- Ovaj hibrid ima izuzetno visok potencijal rodnosti, budući da je masa glavica od 3,0-6,0 kg
- Za berbu dostiže 120 dana nakon sadnje, tada su glavice ovalna oblika, tamno crvene boje
- Odlično se skladišti
- Preporučujemo za sadnju od početka svibnja do sredine lipnja

Preporučeni sklop sadnje: 29-38.000 biljaka/ha

Naziv kultivara	Vegetacija (dana)	Oblik glavice	Namjena	Masa glavice (kg)	Otpornost	Napomena	Sklop (bilj/ha)
Redma RZ	80	okrugli	svježe	1,5-3,0	-	rani okrugli	30-40.000
Rexoma RZ	120	okrugli	svježe/skladištenje	2,0-3,5	-	snažan, stabilan, skladištenje	27-40.000
Futurima RZ	120	ovalni	industrija/skladištenje	3-6	-	visoki prinos	29-38.000

KELJ

Madlene RZ F1

- Izvanredni hibrid tolerantan na visoke temperature vegetacije 90-95 dana
- Formira kompaktne glavice prosječne mase 1,5-2,0 kg koje ne prerastaju
- Blago plosnati oblik glavica tamno zelene boje
- Atraktivnog izgleda, hibrid lagan za berbu
- Snažna biljka s uspravnom lisnom masom koja nije osjetljiva na bolesti
- Dobro podnosi gusti sklop sadnje
- Odlična unutarnja kvaliteta intenzivne žute boje, kocen srednje dužine, blagog okusa
- Pouzdani izbor za berbu u ljetnim mjesecima, formira pravilne glavice i na visokim temperaturama
- Dobro podnosi i niske temperature, može prezimiti do polovice siječnja
- Moguće skladištenje do ožujka

Preporučeni sklop sadnje: 35-42.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Foc:1



Salima RZ F1

- Glavice su spremne za berbu za 55-60 dana nakon sadnje
- Prosječna masa glavica je 1,2-2,0 kg, dobre unutarnje kvalitete, blagog okusa (bez gorčine)
- Idealan izbor za tunele i ranu proizvodnju na otvorenom polju
- Preporučujemo sadnju od sredine veljače u tunele te od početka ožujka do kraja travnja na otvorenom polju

Preporučeni sklop sadnje: 40-55.000 biljaka/ha



Kratice otpornosti na bolesti

HR visoka otpornost

IR srednja otpornost

Foc Fuzarijsko venuće

Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans

Pb Kupusna kila

Plasmodiophora brassicae

Xcc Crna trulež provodnih snopova

Xanthomonas campestris pv. campestris

Tt Duhanov trips

Thrips tabaci

CVJETAČA



Opaal RZ F1

- sorta namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju
- ima dobar porast i za berbu dolazi 55-60 dana nakon sadnje
- cvat je bijele boje, odlična za svježu potrošnju
- preporučujemo za ranu proizvodnju u tunelima ili na otvorenom uz pokrivanje agrilom

Preporučeni sklop sadnje: 35-40.000 biljaka/ha



Paige RZ F1

Pb Defense™

- kultivar vegetacije 65-70 dana s visokom otpornošću na kupusnu kilu (*Plasmodiophora brassicae*)
- preporučujemo za ranu proljetnu sadnju u plastenicima ili na otvorenom, sa ili bez pokrivanja agrilom
- prosječna masa cvati u berbi doseže 1,5-2,0 kg i ima odlično samopokrivanje
- snažna lisna masa se ističe odličnom otpornošću na bolesti

Preporučeni sklop sadnje: 28-35.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Pb:0,1,3



Ponderet RZ F1

- rana cvjetača vegetacije 68-70 dana
- odlična izbor za rani uzgoj u plastenicima i za tehnološki intenzivnu ranu proizvodnju na otvorenom
- odlično formira cvat i u toplijim vremenskim uvjetima
- iznimno kompaktna cvat snježno-bijele boje s dobrim samopokrivanjem
- snažna lisna masa odličnog zdravstvenog stanja
- u slučaju istovremene sadnje zajedno s kultivarom Paige RZ, dobiva se kontinuirana berba

Preporučeni sklop sadnje: 35-40.000 biljaka/ha

Arienzo RZ F1

- Cvjetača koja upotpunjuje ponudu i vegetacijski prati Santamariu RZ kroz cijelu sezonu
- Za berbu dolazi 70-75 dana nakon sadnje
- Blago plosnata cvat je vrhunske kvalitete: čvrsta, snježno bijele boje, mase 1,5-2,0 kg – idealna za supermarket
- Snažna biljka formira široko uspravno lišće
- Izražena voštana prevlaka na listovima čini ovaj hibrid snažnim u borbi protiv bolesti, kao što je Xanthomonas
- Iznimno stabilan hibrid koji nije sklon rubnoj paleži lišća
- Odlično podnosi visoke temperature što ga čini savršenim izborom za ljetnu kultivaciju
- Preporučujemo sadnju od kraja ožujka do kraja srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 28-38.000 biljaka/ha



Santamaria RZ F1

- Santamaria RZ je sinonim za pouzdanost što ga čini jednim od naših najpoznatijih hibrida
- Odlikuje ga savršeno samopokrivanje čime se čuva cvat od proljeća do jeseni
- Kompaktna cvat je atraktivne snježno bijele boje, mase do 3,0 kg
- Pouzdana duljina vegetacije: 78-82 dana u ljeti, 85-90 dana u jesen
- Pouzdan hibrid u intenzivnoj i poluintenzivnoj proizvodnji, idealan za svjež potrošnju i industrijsku preradu
- Preporučujemo ga za sadnju od ranog proljeća do kraja srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 23-33.000 biljaka/ha





Paxton RZ F1

Pb Defense™

- Hibrid srednje kasne cvjetače s visokom otpornošću na kupusnu kilu, može se uzgajati i na poljima zaraženim ovom gljivicom
- Za berbu dolazi 85-90 dana nakon sadnje, stabilna u zamatanju u ljetnom periodu
- Iznimno visoki potencijal prinosa, osim za svježju potrošnju može se koristiti i za industriju
- Prosječna masa cvati je 1,5 kg, no zadržava odličnu kvalitetu čak i do 2,5-3,0 kg
- Formira kompaktnu pravilno zaobljenu snježno-bijelu cvat odličnog samopokrivanja
- Dobro podnosi niže temperature, zbog čega cvat ne gubi kvalitetu ni kod ranih jesenskih mrazeva
- Uspravno lišće ima izraženu voštanu prevlaku zbog čega nije osjetljivo na bolesti
- Zahvaljujući snažnom korijenu, hibrid nije sklon rubnoj paleži i nedostatku kalcija
- Može se saditi od najranijih rokova ispod agrila pa sve do sredine srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 23-33.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Pb:0,1,3



Casper RZ F1

- U pogledu kvalitete i bijele boje cvati, Casper RZ postavlja standard
- Postiže iznimnu kvalitetu cvata čak i u najtežim proizvodnim uvjetima
- Cvat je odlično pokrivena čak i kod mase više od 2,0 kg
- U ljetnim uvjetima za berbu dopijeva 85 dana nakon sadnje, a u jesenskom za 95 dana
- Odličan izbor za intenzivne i ekstenzivne uvjete proizvodnje
- Najbolji se rezultati postižu sadnjom od kraja ožujka do sredine travnja te od početka lipnja do sredine srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 25-35.000 biljaka/ha

Ime kultivara	Vegetacija (dana)	Namjena	Sklop (biljaka/ha)
Opaal RZ	55-60	svježe	35-45.000
Paige RZ	65-70	svježe	28-35.000
Ponderet RZ	68-70	svježe	35-40.000
Arienzo RZ	70-75	svježe	28-38.000
Ormonde RZ	75-82 (85)	svježe	28-40.000
Santamaria RZ	78-82 (90)	svježe/industrija	23-33.000
Paxton RZ	85-90	svježe	23-33.000
Casper RZ	85-95	svježe/industrija	25-35.000
Milandes RZ	125-140	svježe, prezimljavanje	25-35.000
Vitaverde RZ	75-80	zelena cvjetača, svježe	30-35.000
Puntoverde RZ	80-90	romanesco, svježe	30-37.000
Lavendar RZ	70-80	ljubičasta cvat, svježe	30-35.000



BROKULA

Agassi RZ F1

- Formira plavičasto zelenu kompaktnu cvat 75 dana nakon sadnje
- Cvat je polukuglasta oblika, bez znatnih izbočenja pojedinih dijelova cvati i bez prorastanja glavice lišćem
- Prosječna masa cvati je 700-1.100 g, a glavninu prinosa donosi glavna cvat
- Dobro podnosi uzgoj u toplim i suhim uvjetima
- Odličan hibrid za ranu sadnju, za berbu tijekom ljeta i jeseni

Preporučeni sklop sadnje: 35-45.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Foc:1



Orantes RZ F1

- vegetacija 68-72 dana
- kompaktna i teška cvat smještena visoko na biljci – lako se bere
- prosječna masa cvati je 800-1.100 g i dugo zadržava svjež izgled nakon berbe
- hibrid koji ima koncentriranu berbu i moguće je postići visoke prinose
- nije sklon formiranju šuplje stabljike i truljenju
- snažna biljka s zdravom lisnom masom i izraženom voštanom prevlakom
- preporučujemo za ljetnu i jesensku berbu

Preporučeni sklop sadnje: 32-45.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Foc:1



Larsson RZ F1

- Naš najnoviji hibrid brokule u ponudi namijenjen za svjež potrošnju
- Formira izuzetno čvrstu nabijenu cvat mase 0,8-1,5 kg s pravilnim pupovima srednje veličine tamno zelene boje
- Dužina vegetacije 80-85 dana
- Ima široki period berbe nakon ulaska u tehnološku zrelost
- Snažna biljka s jakim korijenovim sustavom
- Ima uspravne listove zbog čega dobro podnosi gusti sklop sadnje
- Izražena lisna prevlaka pomaže u borbi protiv bolesti
- Idealan je za jesensku berbu, s time da je zadnji rok za sadnju kraj srpnja

Preporučeni sklop sadnje: 30-40.000 biljaka/ha

Otpornost: HR: Foc:1



KORABICA



Cindy RZ F1

- Najranija korabica u našoj ponudi
- Pouzdani hibrid koji ima odličan razvoj u uvjetima niskog intenziteta svjetla i niskih temperatura
- Hipokotil je plosnatog oblika, svijetlo-zelene boje, lako se bere
- Preporučujemo za sadnju u negrijane tunele od početka veljače do sredine ožujka
- U grijanim plastenicima može se saditi od sredine prosinca do kraja siječnja



Alme RZ F1

- Korabica namijenjena za sadnju u proljeće/rano ljeto te za kasno ljeto/jesen
- Srednje rani hibrid koji formira hipokotil („jabučicu“) pravilnog, blago plosnatog oblika
- Lisna masa je uspravnog rasta, odličnog zdravstvenog stanja
- Formira pravilan hipokotil čak i u hladnijim uvjetima



Werre RZ F1

- Najbolji izbor za ljetnu proizvodnju, daje izvrsne rezultate uz prilagođenu prihranu
- Namijenjena za sadnju od travnja do sredine kolovoza
- Hipokotil je idealnog plosnato-okruglog oblika
- Lisna masa s izraženom voštanom prevlakom nije osjetljivo na bolesti
- „Jabučica“ ostaje glatka i pravilnog oblika čak i ako prerasta (promjera 12-15 cm)
- Osim za proizvodnju na otvorenom, Werre RZ se može uspješno proizvoditi i u negrijanom zaštićenom prostoru od proljeća do jeseni



Volturmo RZ F1

- kultivar iznimno tolerantan na stresove te je namijenjen za ljetnu proizvodnju na otvorenom
- zahvaljujući snažnom korijenovom sustavu, daje odlične rezultate čak i u lošijim uvjetima uzgoja
- hipokotil je zahvaljujući dužoj stabljici uzdignut od tla što olakšava berbu
- „jabučica“ je svijetle boje, plosnato-okruglog oblika i nije sklona pucanju

Kadmo d.o.o.

Savska Opatovina 115D, 10090 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3864 775
Fax: +385 (0)1 3864 778
OIB: 46413703639
www.kadmo.hr
IBAN PBZ banka: HR2223400091111194391
SWIFT PBZ: PBZGHR2X

KONTAKT OSOBE U UREDU U ZAGREBU**Iva Bigač**

mag. ing. agr.
tel: +385 (0)1 3864 775
iva.kadmo@gmail.com
Logistika, primanje narudžbi, komercijala

Marijan Stepinac

mag. ing. agr.
tel: +385 (0)1 3864 775
stepinac.marijan@gmail.com
Logistika, primanje narudžbi, komercijala, knjigovodstvo

Andrijana Vidaković

struč. spec. oec.
gsm: +385 (0)91 621 08 48
andrijana.kadmo@gmail.com
Specijalistica za high-tech proizvodnju

Kazimir Koraca

mag. ing. agr.
gsm: +385 (0)99 815 1819
kazimir.koraca@gmail.com
Savjetnik i komercijalist za kontinentalnu Hrvatsku, Istru i Sloveniju

Mr. oec. Željko Romic

dipl. ing.
gsm: +385 (0)98 351 855
zromac@kadmo.hr
Direktor

KONTAKT OSOBA – DISTRIBUTIVNI CENTAR TROGIR**Vinko Uljević**

dipl. ing. agr.
gsm: +385 (0)98 456 878.
v.uljevic.kadmo@gmail.com
Savjetnik i komercijalist za priobalnu Hrvatsku

HR Opisi kultivara, ilustracije, tehnološke preporuke i ostale informacije dane u ovoj brošuri, primjerice datumi sjetve, sadnje i berbe, zasnovani su na iskustvima i rezultatima proizašlima iz pokusa i prakse, i dani su u najboljoj namjeri i toliko precizno koliko je to moguće. Rijk Zwaan se ni u kojem slučaju ne obvezuje prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane upotrebom ovih opisa kultivara, ilustracija, tehnoloških preporuka i ostalih informacija. Kupac odnosno korisnik sjemena osobno je odgovoran za prikladno čuvanje sjemena i procjenu da li su proizvodi i tehnološke preporuke prikladni za upotrebu u planiranoj proizvodnji u danim lokalnim proizvodnim uvjetima. Fotografije u ovoj brošuri ne predstavljaju garanciju i ne izražavaju niti impliciraju ponašanje pojedinog kultivara u lokalnim proizvodnim uvjetima.

SL Opisi sort, ilustracije, tehnološka priporočila in ostale informacije, podane v tej brošuri, na primer datumi setve, sajenja in spravila, so zasnovani na izkušnjah ter rezultatih, ki izhajajo iz poskusov in prakse ter so podani z najboljšimi nameni in tako natančno, kolikor je to mogoče. Rijk Zwaan v nobenem primeru ne sprejema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala z uporabo teh opisov sort, ilustracij, tehnoloških priporočil in ostalih informacij. Kupec oziroma uporabnik semen je osebno odgovoren za primerno hranjenje semen in oceno, ali so izdelki in tehnološka priporočila primerni za uporabo v načrtovani pridelavi v danih lokalnih pridelovalnih pogojih. Fotografije v tej brošuri niso zagotovilo in ne izražajo ter ne pomenijo obnašanja posamezne sorte v lokalnih pogojih pridelave.