

FOLICIST®

METABOLIČKI POJAČIVAČ CVATNJE I FORMIRANJA PLODA



Proizvod dopušten u
ekološkoj proizvodnji



- OPTIMIZIRA I UJEDNAČUJE CVATNJU
- OLAKŠAVA STVARANJE POLENA I FORMIRANJE PLODA
- POTPOMAŽE METABOLIZAM BILJKE TIJEKOM REPRODUKTIVNE FAZE

NAČIN DJELOVANJA

Tijekom cvatnje i formiranja ploda potrebne su velike količine energije, bjelančevina, šećera, nukleinskih kiselina i fitohormona kako bi se održala dioba stanica. **FOLICIST®** optimizira cvatnju i formiranje ploda djelujući i kao čimbenik poticanja rasta i kao čimbenik umanjjenja stresa. U stvari:

- **Folna kiselina:** potiče sintezu bjelančevina i nukleinskih kiselina;
 - **Glicin betain:** osigurava oporavak od intenzivnog metaboličkog stresa.
- Učinke potpomažu alge i biljni ekstrakti koji opskrbljuju biljke aminokiselinama, vitaminima, betainima i prirodnim stimulatorima rasta.





ZAŠTO

FOLICIST®

• STOLNO GROŽĐE

CILJ: Formiranje ploda kod sorti bez koštica.

PREDNOSTI: Povećan urod.

• VIŠNJA, MARELICA, BRESKVA, KIVI, CITRUSI

CILJ: Ujednačena i obilna cvatnja. Zametanje ploda.

PREDNOSTI: Povećan urod.

• KRUŠKA, JABUKA

CILJ: Ujednačena cvatnja. Formiranje središnjeg cvijeta.

PREDNOSTI: Povećan urod.

• RATARSKI USJEVI

CILJ: Ujednačena i obilna cvatnja. Formiranje ploda.

PREDNOSTI: Povećan urod.

• POVRTNI USJEVI

CILJ: Ujednačena i obilna cvatnja. Formiranje ploda.

PREDNOSTI: Povećan urod.

• INDUSTRIJSKI USJEVI

CILJ: Formiranje ploda.

PREDNOSTI: Povećan urod.

SASTOJCI

Folna kiselina, glicin betain, ekstrakt *Ascophyllum nodosum*, ekstrakt lucerne.

ANALIZA

w/w

Organski dušik (N)	1,5%
Organski ugljik (C) biološkog podrijetla	11%
Kalijev oksid (K ₂ O)	6,1%
Betaini	10%

FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI

pH (otopina 1%)	8,3±0,5
Gustoća (pri 20°C)	1,21 kg/L

NAČIN PRIMJENE

KULTURA	VRIJEME PRIMJENE	DOZA	
		FOLIJARNO (PREKO LISTA)	FERTIGACIJA
VOĆKE, STOLNO I VINSKO GROŽĐE	2–4 primjene od prije cvatnje do rasta ploda	1–1,5 L/ha (samostalno) 0,5 L/ha (u kombinaciji s ostalim proizvodima)	/
POVRĆE I INDUSTRIJSKI USJEVI	2–4 primjene od prije cvatnje do rasta ploda	1–1,5 L/ha (samostalno) 0,5 L/ha (u kombinaciji s ostalim proizvodima)	2–3 L/ha (nakon presađivanja)
RATARSKI USJEVI	2 primjene (prije cvatnje i formiranja ploda)	1–1,5 L/ha	/
UZGOJ U ZAŠTIĆENOM PROSTORU	2–4 primjene od prije cvatnje do rasta ploda (povrtni usjevi) ili tijekom cijelog ciklusa rasta (lisnato povrće, cvijeće)	100–150 mL/hL (samostalno) 50 mL/hL (u kombinaciji s ostalim proizvodima)	200–300 mL/1000 m ² (nakon presađivanja)

> Doziranje je izračunato na temelju normalnog obujma distribucije.

KOMPATIBILNOST

Proizvod se može miješati sa svim uobičajenim preparatima, osim s proizvodima na bazi bakra i sumpora, mineralnih ulja i emulzija.