

FYLLOTON

BIOSTIMULATOR VEGETATIVNOG RASTA NA BAZI BILJNIH AMINOKISELINA I MORSKIH ALGI

- POBOLJŠAVA OPORAVAK BILJKE OD ABIOTIČKOG STRESA
- UBLAŽAVA ZASTOJE U RAZVOJU USLJED TRETIRANJA AGROKEMIJSKIM PROIZVODIMA
- POTIČE VEGETATIVNI RAST



NAČIN DJELOVANJA

Zahvaljujući sinergiji aminokiselina biljnog podrijetla (dobivenih enzimatskom hidrolizom, postupkom koji ne mijenja njihovu strukturu i funkcionalnost) i morskih algi (bogatih prirodnim stimulatorima rasta), **FYLLOTON**:

- **potiče sintezu bjelančevina i prirodnih tvari rasta:** bogat je triptofanom, prekursorom auksina, koji potiče vegetativni rast biljaka;
- **potiče metaboličke aktivnosti koje štede energiju:** stoga omogućuje biljkama da nastavu rasti u uvjetima okolišnog stresa te da prevladaju zastoje u rastu zbog agrokemijskih tretiranja.





PAKIRANJE: 1 L

ZAŠTO

FYLLOTON

• ZA POBOLJŠANJE VEGETATIVNOG RASTA

NAČIN PRIMJENE:

Redovito na svim usjevima (ekstenzivne kulture, povrće, voćnjaci).

PREDNOSTI:

Povećan urod.

• ZA IZBJEGAVANJE ZASTOJA U RASTU

NAČIN PRIMJENE

Uz herbicide koji se koriste nakon nicanja.

PREDNOSTI:

Kontrola korova; povećan urod.

• ZA BRZO OBNAVLJANJE VEGETATIVNOG RASTA

NAČIN PRIMJENE

Na sve usjeve podložne okolišnom stresu.

PREDNOSTI:

Povećan urod.

SASTOJCI

Kompleks aminoskiselina biljnog podrijetla, ekstrakt *Ascophyllum nodosum*.

ANALIZA

w/w

Organski dušik (N) 6%

Organski ugljik (C) biološkog podrijetla 25,2%

FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI

pH (otopina 1%) 6,9±0,5

Gustoća (pri 20°C) 1,27 kg/L

NAČIN PRIMJENE

USJEV	VRIJEME PRIMJENE	PRIMJENA	DOZA.	
			FOLIJARNO	FERTIGACIJA
VOĆKE, STOLNO I VINSKO GROŽĐE	Tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa	3–4 primjene svakih 7–10 dana	2–2,5 L/ha	10–20 L/ha
POVRĆE I INDUSTRIJSKI USJEVI		3–4 primjene svakih 7–10 dana	1,5–2 L/ha	10–20 L/ha
ŽITARICE		1–2 primjene tijekom vegetacije	2–3 L/ha	–
CVIJEĆE I UKRASNO BILJE		2–3 primjene svakih 7–10 dana	100–200 mL/hL	1–2 L/1000 m ²

> Doziranje je izračunato na temelju normalnog obujma distribucije.

KOMPATIBILNOST

Proizvod se može miješati sa svim uobičajenim preparatima, osim s proizvodima na bazi bakra i sumpora, s lužnatom reakcijom, mineralnih ulja i emulzija.