

BIOSTIMULATOR ZA RAST BILJKE I POVEĆANJE PLODA



PAKIRANJE: 5 L

KOMPONENTE

Biljni ekstrakti, organske kiseline, vitamini, kelirana mikrohranjiva.

NAČIN PRIMJENE

KULTURA	VRIJEME PRIMJENE	DOZA
		FERTIGACIJA
POVRĆE I INDUSTRIJSKI USJEVI NA OTVORENOM	10-20 dana nakon presađivanja. - Nakon što se pojave prvi plodovi - Kod povećanja ploda	15-20 l/ha
POVRĆE U STAKLENIKU Kod kultura dugačkog ciklusa proizvodnje ponavljajte primjenu u pravilnim razmacima.	10-20 dana nakon presađivanja - Nakon što se pojave prvi plodovi - Kod povećanja ploda	1,5-2 l/1000 m ²
VOĆE I STOLNO GROŽĐE	- Cvatnja - Nakon zatanjavanja ploda - Tijekom povećanja ploda	15-20 l/ha
JAGODA	10-15 dana nakon presađivanja - Nakon zime kod kretanja vegetacije - Prije cvatnje - Tijekom povećanja ploda	15-20 l/ha
LISNATO POVRĆE	10 dana nakon presađivanja	15-20 l/ha
CVIJEĆE	10 dana nakon presađivanja - Kod izbijanja cvjetnih pupova - Kod produženja stabiljike	1,5-2 l/1000 m ²
LONČANICE	- Nakon presađivanja u novi lončić - Kod izbijanja cvjetnih pupova - Tijekom rasta stabiljike	2-3 l/m ² vode

➤ DVOSTRUKO DOZIRANJE KADA SE PRIMIJENJUJE NA USJEVE KOJI SU DOŽIVJELI STRES ILI USJEVE S JEDVA RAZVIJENIM KORIJENOM
➤ NA PJEŠKOVITOM TLU SMANJITE DOZU I POVEĆAJTE BROJ PRIMJENA

ANALIZA

Organski dušik (N) 1%
Organski ugljik (C) biološkog podrijetla 10%
Organska tvar s nominalnom molekulskom težinom < 50 kDa: 30%

FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI

pH..... 4,4±0,5
Gustoća (na 20°C) 1,13 kg/L

Ekskluzivni distributer za Hrvatsku:

Kadmo d.o.o.
Savska Opatovina 121
Zagreb
Tel: +385 (0)1 3864 775
www.kadmo.hr



sadrži
ČIMBENIK
UKORJENJIVANJA

NOV@


BIOSTIMULATOR ZA RAST BILJKE I POVEĆANJE PLODA

POBOLJŠAVA RAST KORIJENA I
APSORPCIJU HRANJIVIH TVARI

POTIČE URAVNOTEŽEN
RAST BILJKE

POVEĆAVA VELIČINU I UJEDNAČENOST
PLODOVA

NAMIJENJEN ZA PRIMJENU FERTIRIGACIJOM ZA PRIMJENU OD PRESAĐIVANJA DO FAZE RASTA PLODA





vrijednost iskustva
snaga inovacije

NOV@

NOV@ se temelji na biljnim ekstraktima, organskim kiselinama i vitaminima te keliranim mikronutrijentima. Biljni ekstrakti koje NOV@ sadrži bogati su fitosaponinima i glicin betainom koji zajedno s organskim kiselinama postižu FAKTOR UKORIENJIVANJA koji poboljšava učinkovitost i razvoj korijena, a djeluje na različitim razinama:

- potiče oblikovanje i izduživanje korijena;
- poboljšava apsorpciju hranjivih tvari;
- poboljšava strukturu tla;
- povećava sposobnost zadržavanja vode i nutrijenata.

BIOSTIMULATOR
ZA RAST BILJAKA
I POVEĆANJE PLODA


NOV@ osigurava i polisaharide, aminokiseline, vitamine i kelirane mikronutrijente koji: osnažuju primarni metabolizam biljke; optimiziraju hormonalnu ravnotežu u biljnim tkivima. **NOV@** sa svojim biopotičućim djelovanjem dovodi do bržeg i uravnoteženijeg vegetativnog rasta biljke koja razvija veću lisnu površinu, deblju stabljiku i zelenije i otpornije tkivo. **NOV@** također stimulira povećanje krupnoće i ujednačenosti plodova.



NAČIN DJELOVANJA

HRANIDBENI FAKTOR
POLISAHARIDI,
AMINOKISELINE, VITAMINI,
MIKRONUTRIJENTI

FAKTOR UKORIENJIVANJA
FITOSAPONINI,
GLICIN BETAIN,
ORGANSKE KISELINE



**FAKTOR UKORIENJIVANJA
(fitosaponini, glicin betain, organske kiseline):**

- **potiče strukturalno formiranje korijena:** fitosaponini potiču prirodni protok auksina koji se proizvodi u izdancima i korijenju gdje potiče oblikovanje novih korijenovih dlačica;
- **potiče apsorpciju hranjiva:** fitosaponini su prirodni katalizatori koji potiču usvajanje hranjivih tvari noseći molekule kroz staničnu membranu u tkivo korijena. Hranjive tvari mogu se potom premjestiti iz korijena u ostatak biljke;
- **poboljšava strukturu tla:** organske kiseline potiču koloidnu agregaciju optimizirajući vodo-zračni režim tla;
- **povećava sposobnost zadržavanja vode i hranjivih tvari:** organske kiseline i polisaharidi prirodni su čimbenici kelacije koji povećavaju apsorpciju hranjiva koja se prirodno nalaze u tlu ili se dodaju gnojidbom.

**POLISAHARIDI, AMINO KISELINE, VITAMINI,
KELIRANI MIKRONUTRIJENTI
(visoko učinkovita apsorpcija zahvaljujući FAKTORU UKORIENJIVANJA):**

- **osnažuju primarni metabolizam biljke:** polisaharidi pribavljaju biljci energiju koja joj treba za rast, aminokiseline su građevni blokovi proteina, dok vitamini kataliziraju nekoliko metaboličkih reakcija (proces);
- **optimiziraju hormonalnu ravnotežu:** pribavljajući energiju i metaboličke preduvjete koje biljka treba kako bi sintetizirala vlastite, unutrašnje stimulatore rasta, NOV@ optimizira hormonalnu ravnotežu u svim tkivima biljke.

PROIZVODNI POKUSI



JAGODA

SORTA: CANDONGA
PRIMJENA: 3x2 L/1000 m² s razmakom od 30 dana nakon presađivanja
REZULTATI: uravnoteženija biljka; veći urod (+11%).

6 DANA NAKON PRVE PRIMJENE



NETRETIRANO



NOV@

30 DANA NAKON TREĆE PRIMJENE



NETRETIRANO



NOV@

RAJČICA

SORTA: NEWTON
PRIMJENA: 2x2 L/1000 m² i to 15 i 30 dana nakon sadnje
REZULTATI: jači razvoj korijenova sustava; uravnotežen rast; bolja cvatnja i krupniji plodovi.

10 DANA NAKON PRVE PRIMJENE



NETRETIRANO



NOV@

18 DANA NAKON DRUGE PRIMJENE




NETRETIRANO




NOV@

GROŽĐE

SORTA: VICTORIA
PRIMJENA: 2x20 L/ha svakih 14 dana tijekom faze razvoja bobica.
REZULTATI: bolji razvoj grozdova; veće i ujednačenije bobice.



STANDARD



NOV@

