



Biolchim: program primjene biostimulatora i specijalnih gnojiva u vinovoj lozi

Proizvod, doza, tretiranje	Faza vunastog pupa	Faza početka rasta mladica (3-4 cm)	Faza pred cvatnju grozda	Faza rasta bobica	Faza zriobe (šaranje bobice)	Faza nakon berbe	Cilj tretiranja
FOLICIST 1,5 L/ha dva tretiranja u razmaku 7 dana	■						potiče ujednačeno pupanje
FOLICIST 1,0 L/ha + FYLLOTON 2,0 L/ha dva tretiranja u razmaku 7 dana		■					potiče rast mladica
FOLICIST 1,0 L/ha + NUTRIGEMMA B-Zn 1,5-2,0 L/ha 2-3 tret. u razmaku 7-10 dana			■				potiče cvatnju, zametanje plodova i prevenira nedostatak mikroelemenata
LIGOPLEX Ca 2,0 L/ha 2-3 tretiranja tijekom faze rasta bobica				■			poboljšava čvrstoću bobica i smanjuje njihovo pucanje
SUNRED 4,0-5,0 L/ha 1. primjena kod šaranja grozda 30-40% 2. primjena kod šaranja grozda 60-70%					■		ujednačuje i pospješuje dozrijevanje te povišuje vrijednost °Brix
NUTRIGEMMA B-Zn 2,0-2,5 L/ha nakon berbe, prije opadanja listova						■	hranjenje pupova i poboljšanje cvatnje u sljedećoj sezoni

Za dodatne informacije na raspolaganju Vam stoje inženjeri:



Kadmo d.o.o.
Savska Opatovina 121
HR - 10000 Zagreb
www.kadmo.hr

Kazimir Koraca, mag. ing. agr.
Savjetnik i komercijalist za kontinentalnu Hrvatsku, Istru i Sloveniju
GSM: +385 (0)99 815 1819 — kazimir.koraca@gmail.com



Vinko Uljević, dipl. ing. agr.
Poslovna jedinica Trogir
Savjetnik i komercijalist za obalnu Hrvatsku
GSM: +385 (0)98 456 878 — v.uljevic.kadmo@gmail.com

