

SASTOJCI

Ekstrakt piskavice, ekstrakt kukuruznih klica, ekstrakt *Ascophyllum nodosum*, biljne aminokiseline, triptofan, arginin, biopojivači apsorpcije.

ANALIZA

	w/w
Ukupno dušik (N)	5%
Organski dušik (N)	0,6%
Nitratni dušik (N)	1%
Amonijski dušik (N)	1,7%
Urea (N)	1,7%
Fosfor pentoksid (P ₂ O ₅) topiv u vodi	8,5%
Kalijev oksid (K ₂ O) topiv u vodi	4%
Organski ugljik (C) biološkog podrijetla	3%

FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI

pH (otopina 1%)	6,5±0,5
Gustoća (pri 20°C)	1,21 kg/L

NAČIN PRIMJENE

USJEV	VRIJEME PRIMJENE	DOZA
KOŠTUNIČAVO VOĆE	Od potpunog otpadanja latica, 3 primjene svakih 7–8 dana	2–3 L/ha
JABUČASTO VOĆE	Kada se prorijedi prirodno opadanje plodova, 2–3 primjene svakih 6–7 dana	2,5–3 L/ha
STOLNO GROŽĐE	Nakon formiranja bobica od 3–4 mm, 2–3 primjene svakih 8–10 dana	U zaštićenom prostoru: 1,5 L/ha Na otvorenom: 2–2,5 L/ha
CITRUSI	Nakon formiranja ploda, 3 primjene svakih 12–15 dana	3 L/ha
LUBENICA, DINJA I INDUSTRIJSKA RAJČICA	Nakon formiranja ploda, 3 primjene svakih 6–7 dana	2 L/ha
KRASTAVAC, TIKVICE	Tijekom cijelog ciklusa rasta, ponoviti primjenu svakih 5–7 dana	150–200 mL/100 L
PATLIDŽAN, PAPRIKA, RAJČICA	Nakon formiranja plodova, primijeniti svakih 5–7 dana	150–200 mL/100 L

> Doziranje je izračunato na temelju normalnog obujma distribucije vode.

KOMPATIBILNOST

Proizvod se može miješati sa svim uobičajenim preparatima, osim s proizvodima na bazi bakra. Preporuča se jednostavan test mješavine kako bi se provjerila kompatibilnost.

PAKIRANJE: 1 L

